

Brazo-Mano

Brazo (Puntos):

Amputación a nivel de húmero:			
Unilateral 45-50.	Bilateral 80.		
Pseudoartrosis de húmero inoperable:			
Sin infección activa 15.	Con infección activa 20.		
Osteomielitis activa de húmero: 15.			
Material de osteosíntesis: 1-5.			
Codo Amputación-desarticulación del codo: 40-45.			
Anquilosis-artrodesis de codo:			
En posición funcional 10-20.	En posición no funcional 20-30.		
Limitación de la flexión:			
Mueve menos de 30: 5-15.	Mueve más de 30: 1-5.		
Limitación de la extensión:			
Mueve menos de 60: 5-15.	Mueve más de 60: 1-5.		
Artrosis postraumática y/o codo doloroso: 1-5.			
Prótesis de codo: 15-20.			
M. de osteosíntesis: 1-4.			
Amputación antebrazo:			
Unilateral 40-45.	Bilateral 70-75.		
Anquilosis/artrodesis de la muñeca:			
En posición funcional 8-10.	En posición no funcional 10-15.		
Limitación de la movilidad de la muñeca (grados):			
Pronación (N: 90°): 1-5.	Supinación (N: 90°): 1-5.	Flexión (N: 80°): 1-7.	Extensión (N: 70°): 1-8.
Inclinación radial (N: 25°): 1-3.	Inclinación cubital (N: 45°): 1-3.		
Pseudoartrosis inoperable de cúbito y radio:			

Sin infección activa 18-20.	Con infección activa 20-25.		
Pseudoartrosis inoperable de cúbito:			
Sin infección activa 8-10.	Con infección activa 10-15.		
Pseudoartrosis inoperable de radio:			
Sin infección activa 6-8.	Con infección activa 8-12.		
Artrosis postraumática y/o antebrazo-muñeca dolorosa:1-5.			
M. de osteosíntesis: 1-4.			